

## **PROCTOLOG®**

### **COMPOSICIÓN**

Por 100 g:

Ruscogeninas .....0,5 g

Trimebutina (DCI) .....5,8 g

Excipientes: estearato de polihidroxi etilenglicol, glicéridos semisintéticos, aceite de parafina, nipagin, nipasol, agua destilada, c.s.

### **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Pomada. Envase con 15 ó 30 g.

### **ACTIVIDAD**

En la especialidad Protolog se asocia la acción antiinflamatoria de las ruscogeninas con la anestésica local, espasmolítica y analgésica de la trimebutina.

### **TITULAR Y FABRICANTE**

Titular: DESMA Laboratorio Farmacéutico, S.L. Cuatro Amigos, 7.- Escalera 2, 1º D – 28029

Madrid.

Fabricante: INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA VIR S.A. C/ Laguna 66-68-70, 28923. ALCORCÓN (Madrid).

### **INDICACIONES**

Fisura anal y hemorroides.

### **CONTRAINDICACIONES**

No se han descrito.

### **PRECAUCIONES**

No se han descrito.

### **INTERACCIONES**

No se han descrito.

### **ADVERTENCIAS**

- *Embarazo y lactancia*

No se han descrito

- *Efectos sobre la capacidad de conducción*

No se han descrito

### **POSOLOGÍA**

Seguir la prescripción del médico.

A título indicativo: 1 a 2 aplicaciones por día.

### **SOBREDOSIS**

Es prácticamente imposible la intoxicación por este preparado. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91-562 04 20.

### **REACCIONES ADVERSAS**

Ocasionalmente se han descrito casos de prurito. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

### **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **OTRAS PRESENTACIONES**

PROCTOLOG supositorios: Envase con 10 supositorios.

### **SIN RECETA MÉDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

TEXTO REVISADO: MAYO 2011

**Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**